



## 医薬品タイムリー情報

(第10号)

## 年1回投与 骨粗鬆症治療剤

採用 : リクラスト点滴静注液5mg

## 名称の由来

Re-(後退する、離れるを意味する接頭辞)と破骨細胞(Osteoclast)に由来する

貯法	室温保存
規制区分	劇薬
組成	1ボトル(100mL)中ゾレドロン酸として5.0mg含有
効能又は効果	骨粗鬆症
用法及び用量	成人には1年に1回ゾレドロン酸として5mgを <u>15分以上かけて点滴静脈内投与する</u>

## 【重大な副作用】

- 1 急性腎不全、間質性腎炎、ファンコニー症候群
- 2 低カルシウム血症
- 3 顎骨壊死・顎骨骨髓炎
- 4 大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折
- 5 外耳道骨壊死
- 6 アナフィラキシー

## 【適用上の注意】

- 1 カルシウム及びマグネシウム等の2価陽イオンを含有する点滴用液と混合しない
- 2 本剤は他の薬剤と混ぜたり、同時に投与したりしない  
他剤とは別の点滴ラインから一定の速度で投与する
- 3 ビスホスホネート系薬剤と重複して投与しないように注意する  
「リカルボン錠、アクトネル錠、アレンドロン酸(ボナロン錠・経ロゼリー)」ほか

