

医薬品タイムリー情報

(第14号)

使用前に開通が必要な医薬品一覧

【 開通が必要な理由 】

高カロリー輸液製剤は、グルコース、アミノ酸、電解質などから構成されているが、グルコースとアミノ酸を混合し時間が経過すると輸液が褐色に着色し、効果が下がる(メイラード反応という)。この反応を防止するため、投与直前に隔壁を開通し混合する必要がある。

【 当施設採用品 】

エルネオパNF

※開通方法

1 下室の中央にある を両手で **勢いよく 押す**

両手で勢いよく!

ボン 隔壁開通!

下室 隔壁 小室 上室

下室 隔壁 小室 上室

2 上室・下室を **同時に強く 押して、隔壁部を完全に開通させる**

隔壁部が盛り上がる

隔壁の端まで開くように、しっかりと押してください

この操作で、小室も完全に開きます。

3 内容液全体が均一な黄色になるまで、上室・下室を **交互に 押す**

下室 交互に 上室


※ 当施設でのエルネオパNFの採用規格品は4種類

1号 1000mL

1号 1500mL

2号 1000mL

2号 1500mL



ビーフリード輸液 500mL




②開通確認カバーが外れたことを確認すること。

※ 上室を押すと開通確認カバーが開かないため、必ず下室を押して隔壁を開通すること。

①このマークを両手で押すこと。

ペリセート 腹膜透析液

※ ペリセートは腹膜透析用液であるが高カロリー輸液と同様に、使用直前に開通が必要な製剤である。



薬局では、払出時に左図のラベルを添付し、注意喚起を促している。