

2019年 2月14日

病院長

石州会 薬局

医薬品タイムリー情報

(第20号)

インスリン製剤の使用期限と保管温度

◎ノボリンR(バイアル製剤)の**開封後**の保管が室温保存へ変更となります

製剤名	保管温度		開封後 使用期限	
	使用前	開封後		
ノボリンR (バイアル製剤)	2~8℃ 遮光保存	冷蔵庫に入れず、室温・遮光保管	6週間以内	
ノボリンR注フレックスペン		室温 遮光保存	6週間以内	
ヒューマリンR注ミリオペン			28日以内	
ノボラピッド注 フレックスペン			4週間以内	
ヒューマログ注ミリオペン			28日以内	
ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン			4週間以内	
ヒューマログミックス50注 ミリオペン			28日以内	
ランタス注ソロスター			4週間以内	
インスリングラルギンBS注 ミリオペン			30℃以下の 室温	28日以内
ノボリンN注フレックスペン			室温・遮光保存	6週間以内
ビクトーザ皮下注18mg			室温保管	30日以内
トルリシティ皮下注0.75mg アテオス	2~8℃ ※ 遮光保存			

※ 室温で保存する場合は、14日以内に使用すること。その際には、遮光にて保存し、また30℃を超える場所で保存しないこと

【参考】

ヘパリンナトリウム注 1万単位/10mL「AY」	遮光 室温保存	冷所保存	7日以内
キシロカイン注射液 1%E エピレナミン入り	遮光 冷所保存	遮光 冷所保存	40日以内